

# LIMITES DE SUITES

Étudier la limite d'une suite  $(u_n)$ , c'est examiner le comportement des termes  $u_n$  lorsque  $n$  prend des valeurs de plus en plus grandes vers  $+\infty$ .

## 1) LES DIFFÉRENTS CAS POSSIBLES

Soit une suite  $(u_n)$ .

### cas 1

Intuitivement, si «  $u_n$  est aussi grand que l'on veut dès que  $n$  est assez grand », alors on dit que la suite  $(u_n)$  a pour limite  $+\infty$ .

On note :

**De manière plus mathématique :**

**Exemple :**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$

### cas 2

Intuitivement, si les termes  $u_n$  finissent par être négatifs et « si  $u_n$  est aussi grand que l'on veut en valeur absolue dès que  $n$  est assez grand », alors on dit que la suite  $(u_n)$  a pour limite  $-\infty$ .

On note :

**De manière plus mathématique :**

**Exemple :**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} -n^2 = -\infty$

**Remarque :**

### cas 3 (suite convergente)

Soit  $L$  un réel donné.

Intuitivement, dire que  $(u_n)$  a pour limite  $L$ , signifie que lorsque  $n$  est de plus en plus grand, « les nombres  $u_n$  correspondants viennent s'accumuler autour de  $L$  ».

On note :

**De manière plus mathématique :**

**Exemple :**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$

**Remarque :**

Si une suite  $(u_n)$  a une limite finie  $L$ , alors la limite  $L$  est unique.

### cas 4

Aucun des trois cas ne se produit.

**Exemple :**

**Remarque :** Une suite qui ne converge pas est **divergente**. (cas 1, cas 2, cas 4)

## 2) OPÉRATIONS SUR LES LIMITES

Les théorèmes qui suivent, présentés sous forme de tableaux, sont admis.

Pour la plupart d'entre eux, ils sont naturels mais ... comme souvent en mathématiques, il y a quelques cas particuliers.

On note par un point d'interrogation « ? » les cas où il n'y a pas de conclusion générale.

On dit qu'il s'agit de cas de formes indéterminées. Ces cas nécessiteront une étude particulière chaque fois qu'ils se présenteront.

- **Limite de la suite de terme général  $k \times u_n$  (où  $k$  est un réel donné)**

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$L$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (k \times u_n)$ (avec $k > 0$ )			
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (k \times u_n)$ (avec $k < 0$ )			

**Exemple :**

Soit la suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = 5n^2$

• **Limite de la suite de terme général  $u_n + v_n$**

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$L$	$L$	$L$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n)$						

**Exemple :**

Soit la suite  $(w_n)$  définie pour  $n \in \mathbb{N}^*$  par  $w_n = 5n^2 + \frac{1}{n}$

• **Limite de la suite de terme général  $u_n \times v_n$**

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$L$	$L > 0$	$L > 0$	$L < 0$	$L < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$0$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n)$									

**Exemple :**

Soit la suite  $(w_n)$  définie pour  $n \in \mathbb{N}^*$  par  $w_n = -n^2 \times \left(5n^2 + \frac{1}{n}\right)$

• **Limite de la suite de terme général  $\frac{u_n}{v_n}$**

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$L$	$L$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	$L > 0$ ou $+\infty$	$L > 0$ ou $+\infty$	$L < 0$ ou $-\infty$	$L < 0$ ou $-\infty$	$0$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$L'$	$+\infty$ ou $-\infty$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	0 en restant positive	0 en restant négative	0 en restant positive	0 en restant négative	$0$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$												

Cas où  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \neq 0$

Cas où  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

**Remarques :**

- « 0 en restant négative ou positive » signifie qu'il existe  $n_0 \in \mathbb{N}^*$  tel que pour tout  $n > n_0$ ,  $(v_n)$  garde un signe constant.
- On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^+$  pour indiquer que  $(v_n)$  tend vers 0 en restant positive.
- On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^-$  pour indiquer que  $(v_n)$  tend vers 0 en restant négative.

**Exemple :**

Soit la suite  $(w_n)$  définie pour  $n \in \mathbb{N}^*$  par  $w_n = \frac{5n^2 + \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}$

**3) LIMITES ET COMPARAISON**

**Propriété :**

Soit deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

- 
- 

**Preuve du premier point : exigible**

Le deuxième résultat se démontre de la même façon.

**Exemple :**

Soit la suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = n - \sin(n)$

**Propriété :**

- Soit une suite  $(u_n)$  croissante telle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$ , alors tous les termes de la suite  $(u_n)$  sont inférieurs ou égaux à  $L$ .
- Soit une suite  $(u_n)$  décroissante telle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$ , alors tous les termes de la suite  $(u_n)$  sont supérieurs ou égaux à  $L$ .

**Preuve du premier point : exigible**

Raisonnons par l'absurde :

**Théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement : admis**

Soit  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites vérifiant à partir d'un certain rang  $u_n \leq w_n \leq v_n$   
Si  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont deux suites convergentes de même limite  $L$ , alors la suite  $(w_n)$  est convergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L$ .

**4) LIMITE DE LA SUITE  $(q^n)$  où  $q \in \mathbb{R}$**

**Propriété :**

- |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soit $q \in \mathbb{R}$ . <ul style="list-style-type: none"><li>• Si <math>-1 &lt; q &lt; 1</math>, alors</li><li>• Si <math>q = 1</math>, alors</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si <math>q &gt; 1</math>, alors</li><li>• Si <math>q \leq -1</math>, alors</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Preuve du troisième point : exigible**

- Soit  $a > 0$ . Montrons par récurrence que pour tout entier  $n$ ,  $(1 + a)^n \geq 1 + na$

Soit  $P(n)$  la proposition : « $(1 + a)^n \geq 1 + na$ »

**Initialisation :**

pour  $n = 0$ , on a :

**Hérédité :**

Supposons que la proposition  $P(n)$  soit vraie pour un entier naturel fixé  $n$ .

On a donc :  $(1 + a)^n \geq 1 + na$

Montrons que  $P(n+1)$  est vraie, c'est-à-dire que :

La proposition  $P(n+1)$  est alors vérifiée.

**Conclusion :**

On a donc démontré par récurrence que la proposition  $P(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq 0$ .

c'est-à-dire que :  $(1 + a)^n \geq 1 + na$  pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$

- Montrons que si  $q > 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$

**Exemple :**

La suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = 2^n$  est une suite géométrique de raison 2 supérieur à 1 ; elle est donc divergente et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

**Remarque :**

On en déduit facilement la limite d'une suite géométrique de terme général  $u_0 q^n$ .

**Exemple :**

Soit  $(v_n)$  La suite définie par  $v_n = -5 \times 2^n = -5 \times u_n$  où  $u_n = 2^n$ .

On a vu que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  ; on en déduit que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ .

**5) CONVERGENCE DE SUITES MONOTONES**

**Définition : rappel**

- Une suite  $(u_n)$  est **majorée** s'il existe un réel  $M$  tel que pour tout entier naturel  $n$ , on ait  $u_n \leq M$ .
- Une suite  $(u_n)$  est **minorée** s'il existe un réel  $m$  tel que pour tout entier naturel  $n$ , on ait  $u_n \geq m$ .
- Une suite  $(u_n)$  est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Comme pour les fonctions, on dit que  $M$  (respectivement  $m$ ) est **un majorant** (respectivement **minorant**) de la suite.

**Propriété : admise**

- Toute suite croissante majorée est convergente.
- Toute suite décroissante minorée est convergente.

**Remarques :**

- La propriété permet de justifier qu'une suite est convergente, mais elle ne permet pas de donner la limite.
- Si une suite est majorée par  $M$ , sa limite, si elle existe, est nécessairement inférieure ou égale à  $M$ .
- Lorsqu'une suite définie par récurrence est convergente, la relation de récurrence permet de déterminer une relation vérifiée par la limite.

**Exemple :**

Soit une suite  $(u_n)$  vérifiant la relation de récurrence  $u_{n+1} = 3u_n + 5$ .

Si  $(u_n)$  est convergente, alors sa limite  $L$  vérifie la relation :

**Attention :** Cette relation ne permet en aucun cas d'affirmer que cette suite est convergente.

Si  $u_0 = -\frac{5}{2}$ , la suite est convergente (c'est une suite constante) et si  $u_0 \neq -\frac{5}{2}$  la suite n'est pas convergente.

Elle a pour limite  $+\infty$  ou  $-\infty$ .

**Propriété :**

- Toute suite croissante non majorée a pour limite  $+\infty$ .
- Toute suite décroissante non minorée a pour limite  $-\infty$ .

**Preuve du premier point : exigible**

Soit  $(u_n)$  une suite croissante non majorée.

On démontre d'une façon similaire qu'une suite décroissante non minorée a pour limite  $-\infty$ .

**Remarque :**

Une suite non majorée n'a pas nécessairement pour limite  $+\infty$ . Une telle suite a des termes aussi grands que l'on veut puisqu'elle n'est pas majorée, mais elle n'a pas nécessairement ses termes aussi grands que l'on veut à partir d'un certain rang.

On peut citer comme exemple la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = ((-1)^n + 1)n$