

Texp

Devoir n° 6

- Durée 1 h

- Calculatrices autorisées



Barème :

1) 10 pts 2) 5 pts 3) 5 pts

Nom :

Ex 1 : 1) On considère l'équation $z^2=1+i$ (E_1) . On pose $z=x+iy$ où x et y sont des réels.

a) Combien cette équation a-t-elle de solutions dans \mathbb{C} :

b) Trouver un système d'équations vérifié par x et y .

c) Ce système est-il suffisant pour déterminer x et y ? (*la réponse est évidente ... étant donné les questions suivantes*) :

d) En utilisant le module, déterminer une autre équation vérifiée par x et y .

e) En déduire x^2 et y^2 .

f) En déduire les solutions (que l'on notera z_1 , z_2 ...) de l'équation (E_1)

2) On considère maintenant l'équation $z^4 - 2z^2 + 2 = 0$ (E)

a) Combien cette équation admet-elle de solutions dans \mathbb{C} :

b) Montrer que si z est solution de (E) , alors \bar{z} et aussi solution de (E) .

c) Montrer que les solutions de l'équation (E_1) sont aussi des solutions de l'équation (E)

d) En déduire sans calcul toutes les solutions de (E).

Ex 2 : Soit $P(z) = z^4 - 2z^3 + 17z^2 - 18z + 72$

1) a) Trouver $k \in \mathbb{N}$, tel que ki soit une racine de P .

b) En déduire (sans démonstration) une autre racine de P :

2) Justifier que $P(z)$ peut être factorisé par $z^2 + k^2$.


3) Déterminer l'ensemble des racines de P .

Ex 3 : Soit $P(z) = 2z^4 + 20z^3 + 35z^2 - 75z$

1) Déterminer deux réels a et b tels que $P(z) = a(z^2 + 5z)^2 + b(z^2 + 5z)$

2) Factoriser $P(z)$ dans les réels.

3) Résoudre l'équation $P(z) = 0$ dans \mathbb{C} .



correction :

Ex 1 : 1) a) 2

$$\text{b) } (x+iy)^2 = (1+i) \Leftrightarrow x^2 - y^2 + i \times 2xy = 1+i \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ 2xy = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ xy = \frac{1}{2} \end{cases}$$

c) non

d) $z^2 = 1+i \Rightarrow |z|^2 = |1+i| \Rightarrow |z|^2 = \sqrt{2} \Rightarrow x^2 + y^2 = \sqrt{2}$

$$\text{e) On a } \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ 2x^2 = 1 + \sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = \frac{-1 + \sqrt{2}}{2} \\ x^2 = \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}} \text{ ou } y = -\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}} \\ x = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} \end{cases}$$

f) Comme $xy > 0$, on en déduit que x et y sont de même signe.

Les deux solutions de (E_1) sont donc : $z_1 = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}}$ et $z_2 = -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}}$

2) a) 4

b) $z^4 - 2z^2 + 2 = 0 \Rightarrow \overline{z^4 - 2z^2 + 2} = \bar{0} \Rightarrow z^4 - 2z^2 + 2 = 0$

c) On pose $Z = z^2$.

On est alors amené à résoudre l'équation $Z^2 - 2Z + 2 = 0$

$\Delta = 4 - 8 = -4$

Cette équation a donc deux solutions complexes : $Z_1 = \frac{2-2i}{2} = 1-i$ et $Z_2 = \frac{2+2i}{2} = 1+i$

Les solutions de (E) sont donc les solutions des équations $z^2 = 1-i$ et $z^2 = 1+i$, c'est à dire de l'équation (E_1) .

d) Les solutions de (E_1) sont solutions de (E) , d'après la question 2b) leurs conjuguées sont aussi solutions. On obtient :

$$z_1 = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}}, \quad z_2 = -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}}, \quad z_3 = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}} \quad \text{et} \quad z_4 = -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{2}}{2}}$$

Ex 2 : 1) a) $P(3i) = (3i)^4 - 2(3i)^3 + 17(3i)^2 - 18(3i) + 72 = 81 + 54i - 153 - 54i + 72 = 0$

b) Comme les coefficients sont réels, on aussi $P(\bar{3i}) = 0$, c'est à dire $P(-3i) = 0$

2) $P(3i) = 0$, donc P est factorisable par $z - 3i$.

$P(-3i) = 0$, donc P est factorisable par $z + 3i$.

Ainsi P est factorisable par $(z - 3i)(z + 3i) = z^2 + 9$

3) On peut écrire P sous la forme $P(z) = (z^2 + 9)(z^2 + az + b)$

(On sait déjà que le coefficient de z^2 du trinôme du second degré est 1, car le coefficient de z^4 de P est 1)

Pour tout complexe z , on a :

$$\begin{aligned} (z^2 + 9)(z^2 + az + b) &= z^4 + az^3 + bz^2 + 9z^2 + 9az + 9b \\ &= z^4 + az^3 + (9+b)z^2 + 9az + 9b \end{aligned}$$

En identifiant avec $P(z) = z^4 - 2z^3 + 17z^2 - 18z + 72$, on obtient :

$$\begin{cases} a = -2 \\ 9 + b = 17 \\ 9a = -18 \\ 9b = 72 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 8 \end{cases}$$

Donc $P(z) = (z^2 + 9)(z^2 - 2z + 8)$

$$z^2 - 2z + 8 = 0 \Leftrightarrow z = 1 - \sqrt{7}i \text{ ou } z = 1 + \sqrt{7}i \quad (\text{facile})$$

Les racines de P sont donc : $3i, -3i, 1 - \sqrt{7}i$ et $1 + \sqrt{7}i$

Ex 3 : 1) $a(z^2 + 5z)^2 + b(z^2 + 5z) = a(z^4 + 10z^3 + 25z^2) + bz^2 + 5bz = az^4 + 10az^3 + (25a + b)z^2 + 5bz$

En identifiant avec $P(z) = 2z^4 + 20z^3 + 35z^2 - 75z$, on obtient $\begin{cases} a = 2 \\ b = -15 \end{cases}$

Donc pour tout complexe z , on a : $P(z) = 2(z^2 + 5z)^2 - 15(z^2 + 5z)$

2) Pour tout complexe z , on a :

$$P(z) = 2(z^2 + 5z)^2 - 15(z^2 + 5z) = (z^2 + 5z)(2z^2 + 10z - 15) = z(z+5)(2z^2 + 10z - 15)$$

3) $P(z) = 0 \Leftrightarrow z = 0 \text{ ou } z = -5 \text{ ou } z = -\frac{5}{2} - \frac{\sqrt{55}}{2} \text{ ou } z = -\frac{5}{2} + \frac{\sqrt{55}}{2}$ (en calculant $\Delta \dots$)

