

Normes, projections orthogonales

Ex 5-1 : Vrai ou faux - restituer les notions du cours

- 1)  $\|\vec{AB}\| = \|\vec{BA}\|$
- 2)  $\| -5 \vec{u} \| = -5 \|\vec{u}\|$
- 3) Si  $\|\vec{u}\| = 3$  et  $\|\vec{v}\| = 4$ , alors  $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$
- 4) Si I est le milieu de [AB], alors  $\|\vec{AB}\| = \|\vec{AI}\| + \|\vec{IB}\|$
- 5) Si A, B et C sont trois points alignés, alors  $\|\vec{AC}\| = \|\vec{AB}\| + \|\vec{BC}\|$
- 6) Si les projections orthogonales de deux vecteurs sont égales, alors ces deux vecteurs sont égaux.
- 7) Si  $\vec{AB}$  a pour projeté orthogonal  $\vec{A'B'}$  sur une droite  $d$ , alors  $ABB'A'$  est un parallélogramme.
- 8) Si ABCD est un parallélogramme, alors le projeté orthogonal de  $\vec{AB}$  sur une droite  $d$  est égal au projeté orthogonal de  $\vec{DC}$  sur  $d$ .
- 9) Si  $\vec{u'}$  est le projeté orthogonal de  $\vec{u}$  sur une droite  $d$ , alors  $\|\vec{u'}\| \leq \|\vec{u}\|$
- 10) Si  $\vec{u'}$  est le projeté orthogonal de  $\vec{u}$  sur une droite  $d$ , alors  $3\vec{u'}$  est le projeté orthogonal de  $3\vec{u}$  sur  $d$ .

Ex 5-2 : Normes

Soit un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Dans chacun des cas suivants, calculer la norme du vecteur  $\vec{u}$  ou du vecteur  $\vec{AB}$ .

1)  $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$


2)  $\vec{u} \begin{pmatrix} \sqrt{3}-5 \\ \sqrt{3}+5 \end{pmatrix}$

3) A  $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$  et B  $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$

Ex 5-3 : Projection orthogonale

ABCD est un losange de centre O. ABD est un triangle équilatéral. Déterminer les projections orthogonales suivantes :

- 1)  $\vec{AB}$  sur (BD) :
- 2)  $\vec{AD}$  sur (DE) :
- 3)  $\vec{AD}$  sur (DF) :
- 4)  $\vec{DE}$  sur (DB) :
- 5)  $\vec{DE}$  sur (BG) :
- 6)  $\vec{EF}$  sur (AC) :



Les différentes expressions du produit scalaire

Ex 5-4 : Vrai ou faux - restituer les notions du cours

- 1) Si  $\|\vec{u}\| = 5$ ,  $\|\vec{v}\| = 12$  et  $\cos(\alpha) = \frac{1}{3}$ , alors  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20$   
(où  $\alpha$  représente l'angle entre  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ )
  - 2)  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{CA} \cdot \vec{BA}$
- Pour les questions 3, 4 et 5, on considère que  $\vec{AB} = \vec{CD}$  et  $\vec{EF} = \vec{GH}$
- 3)  $\vec{AB} \cdot \vec{EF} = \vec{CD} \cdot \vec{GH}$
  - 4)  $\vec{AB} \cdot \vec{EF} = \vec{GH} \cdot \vec{CD}$
  - 5)  $\vec{AA} \cdot \vec{CD} = \vec{0}$
  - 6) Si les points A, B et C sont alignés, alors  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC$

Pour les dernières questions, on considère un triangle ABC rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A.

- 7)  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$  : 8)  $\vec{AH} \cdot \vec{AB} = 0$  : 9)  $\vec{CA} \cdot \vec{CB} > 0$  :
- 10)  $\vec{HC} \cdot \vec{CA} > 0$  11)  $\vec{HB} \cdot \vec{HC} = -\vec{BH} \cdot \vec{HC}$
- 12)  $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = \vec{HB} \cdot \vec{BC}$  13)  $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = AB^2$

Ex 5-5 : Choisir la méthode la plus adaptée

Dans chacun des cas ci-dessous, calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .


1)  $AB=4$ ,  $AC=5$  et  $\widehat{BAC} = 45^\circ$

2)  $AB=2$ ,  $AC=7$  et  $\widehat{BAC} = \frac{5\pi}{6}$

3) Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on a  $A(2;3)$ ,  $B(-4;5)$  et  $C(-5;-7)$

4) ABCD est un losange dont la longueur des côtés vaut 4 et tel que  $\widehat{ADC} = \frac{\pi}{6}$ . On donnera une approximation à  $10^{-2}$  près.

5) I est le milieu de [BC].




**Ex 5-6 : Choisir la méthode la plus adaptée**

Les questions ci-dessous sont indépendantes.

1) Soit ABCD un carré de côté 4 et E, le point du segment [AC] tel que  $AE=0,4AC$ . Calculer  $\vec{AD} \cdot \vec{AE}$

2) On considère l'octogone ci-contre avec  $HD=8$ .

Calculer :  $\vec{OD} \cdot \vec{OG}$



$\vec{FB} \cdot \vec{FD}$

$\vec{AD} \cdot \vec{AH}$


$\vec{FB} \cdot \vec{FA}$

3) ABC est un triangle équilatéral de côté 5 cm. I est le milieu de [BC]. Calculer :


$\vec{BA} \cdot \vec{BC}$

$\vec{CA} \cdot \vec{CI}$

$(\vec{AB} - \vec{AC}) \cdot \vec{AI}$

**Calculer un angle ou une longueur avec le produit scalaire****Ex 5-7 : Déterminer un angle**1) Dans chacun des cas calculer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .2) En déduire  $\widehat{BAC}$ **Ex 5-8 : Déterminer une longueur**On considère un rectangle ABCD tel que  $AB=5$  et  $AD=3$ .


Les points E et F sont les projetés orthogonaux des points A et C sur la droite (BD).

En calculant de deux façons différentes le produit scalaire  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB}$ , déterminer la valeur exacte de la longueur EF.**Ex 5-9 : Déterminer l'angle au sommet d'un triangle isocèle**Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les points  $A(-3;2)$ ,  $B(-1;5)$  et  $C(1;2)$ .Montrer que le triangle ABC est isocèle et donner une mesure de son angle au sommet en degré à  $10^{-1}$  près.

**Propriétés – Opérations vectorielles****Ex 5-10 : Vrai ou faux - restituer les notions du cours**

- 1) Si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{t}$ , alors  $\vec{v} = \vec{t}$
- 2) Si  $\|\vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2$ , alors  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$
- 3) Si  $\|\vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2$ , alors  $\vec{u} = \vec{v}$  ou  $\vec{u} = -\vec{v}$
- 4) Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux, alors  $4\vec{u}$  et  $-5\vec{v}$  sont orthogonaux.
- 5) Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux, alors  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$

Pour les dernières questions, on considère un triangle équilatéral ABC et H le pied de la hauteur issue de A.



- 6)  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AH^2$
- 7)  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0,5 AB^2$
- 8)  $\vec{AH} \cdot \vec{AB} = 0,75 AB^2$

**Ex 5-11 : Quelques calculs**

Soit deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  tels que  $\|\vec{u}\|=3$ ,  $\|\vec{v}\|=4$  et  $\vec{u} \cdot \vec{v}=8$   
Calculer :

- 1)  $\vec{u} \cdot (3\vec{u} - 2\vec{v})$
- 2)  $(\vec{u} - 5\vec{v}) \cdot (3\vec{u} - 2\vec{v})$
- 3)  $(\vec{u} - 3\vec{v})^2$
- 4)  $\|\vec{u} + \vec{v}\|$
- 5)  $\|\vec{u} - \vec{v}\|$

6)  $\|\vec{2u} - 5\vec{v}\|$

**Ex 5-12 : Avec les normes**

- 1) Existe-t-il deux vecteurs
- $\vec{u}$
- et
- $\vec{v}$
- tels que :

$$\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$$

- 2) Montrer que
- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$

- 3) Peut-on déterminer deux vecteurs
- $\vec{u}$
- et
- $\vec{v}$
- tels que :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

**Ex 5-13 : Relation de Chasles et linéarité**

Soit 4 points A, B, C et D tels que  $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 4$  et  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3$ .  
Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$

**Orthogonalité et alignement****Ex 5-14 : Vecteurs orthogonaux ?**

Le plan est rapporté à un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Dans chacun des cas, dire si les vecteurs sont orthogonaux :

1)  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4876 \\ -4898873 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 317019173 \\ 315539 \end{pmatrix}$

2)  $\vec{w} \begin{pmatrix} 18^{497} \\ 17^{512} \end{pmatrix}$  et  $\vec{t} \begin{pmatrix} 17^{513} \\ 18^{498} \end{pmatrix}$

3)  $\vec{w} \begin{pmatrix} 18^{497} \\ 306^{43} \end{pmatrix}$  et  $\vec{s} \begin{pmatrix} -17^{497} \\ 306^{454} \end{pmatrix}$

**Ex 5-15 : Triangle rectangle**

Le plan est rapporté à un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

On donne  $M(2; \lambda)$ ,  $A(1; 3)$  et  $L(4; 3 - \lambda)$ .

Déterminer le(s) réel(s)  $\lambda$  tel que le triangle MAL soit rectangle en A.

**Ex 5-16 : Démontrer que des droites sont perpendiculaires**


Soit ABCD un carré de côté  $a$ , I le milieu de [AB] et J le milieu de [AD].

Démontrer que les droites (CJ) et (DI) sont perpendiculaires.

**Ex 5-17 : Démontrer que des points sont alignés**

Soit ABE un triangle équilatéral de côté  $a$ , le carré ABCD contenant E et le carré EBGF contenant C.

1) Exprimer  $\vec{BC} \cdot \vec{BE}$  et  $\vec{EA} \cdot \vec{EB}$  en fonction de  $a$ .



2) Montrer que BCG est un triangle équilatéral.

3) Exprimer  $\vec{BC} \cdot \vec{BG}$  et  $\vec{DA} \cdot \vec{EF}$  en fonction de  $a$ .

4) Exprimer  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{EF}$  en fonction de  $a$ .

5) En déduire la valeur de  $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BF}$ .

6) Démontrer que les point D, E et G sont alignés.

#### Ex 5-18 : Caractériser un quadrilatère

Soit ABC un triangle équilatéral de côté  $a$ .

D et E sont les points tels que  $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ .

1) Exprimer  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$  en fonction de  $a$ .

2) Exprimer  $\overrightarrow{DE}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .

3) Démontrer que les droites (AC) et (DE) sont perpendiculaires.

4) On note H le point d'intersection des droites (AC) et (DE).  
Exprimer  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}$  en fonction de  $a$ , puis déterminer la distance AH.

5) En déduire la nature du quadrilatère EBHC.

#### Ex 5-19 : Dans un parallélogramme – Théorème d'Al Kashi

Soit ABCD un parallélogramme de centre I tel que  $AB=6$ ,  $AD=4$  et

$\widehat{BAD} = 60^\circ$ .  
1) Calculer  $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2$  et  $(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD})^2$ . En déduire AC et BD.

2) À l'aide du théorème d'Al Kashi, retrouver la distance BD.

### Ex 5-20 : Théorème de la médiane

Soit un triangle ABC . On note I le milieu de [BC].

Montrer que  $AB^2 + AC^2 = 2 AI^2 + \frac{BC^2}{2}$

### Ex 5-21 : Théorème de la médiane et théorème d'Al Kashi

On souhaite construire un parallélogramme ABCD dont on connaît les longueurs des diagonales et un angle :

AC=7, BD= $\sqrt{19}$  et  $\widehat{BAD}=60^\circ$  .

On pose  $x=AB$  et  $y=AD$  .

1) A l'aide du théorème de la médiane, démontrer que  $x^2 + y^2 = 34$  .

2) En utilisant l'angle  $\widehat{BAD}$  , démontrer que  $x^2 + y^2 - xy = 19$  .

3) En déduire les dimensions du parallélogramme ABCD et le construire.

### Ensembles de points

Ex 5-22 : Conjecture avec GeoGebra :  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$

Soit A et B deux points tels que AB=4 cm . On cherche l'ensemble des points M du plan tels que  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$  , ( $k \in \mathbb{R}$ ) .

1) Dans GeoGebra, placer deux points A et B tels que AB=4.

2) Créer un point libre M puis une expression « ps » permettant de calculer le produit scalaire  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$  .


(Utiliser la formule avec les normes et les angles)

3) Créer un curseur « k » variant de -20 à 20, puis définir un affichage conditionnel de M en bleu lorsque  $ps > k$  et rouge lorsque  $ps < k$ .

(Clic droit sur le point > propriétés > avancé > couleurs dynamique)

4) Choisir  $k=12$ , puis activer la trace de M et balayer la zone de construction jusqu'à pouvoir conjecturer l'ensemble des points M tels que  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 12$ .

Démontrer cette conjecture.



5) **Régionnement du plan :**

Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} \geq 12$


6) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = -6$

**Ex 5-23 :**  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$

Soit les points A(-1;2) et B(3;-1).

1) Déterminer l'ensemble  $F_1$  des points M tels que  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -1$

Introduire le milieu I de [AB].



2) Déterminer l'ensemble  $F_2$  des points M du plan tels que

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -\frac{25}{4}$$



**Ex 5-24 :  $MA^2 + MB^2 = k$** 

Soit A et B deux points distincts du plan, I le milieu du segment [AB] et  $k$  un nombre réel.

1) Pour tout point M du plan, montrer que :

$$MA^2 + MB^2 = k \Leftrightarrow MI^2 = \frac{1}{2} \left( k - \frac{AB^2}{2} \right)$$

3) Déterminer l'ensemble  $F_3$  des points M du plan tels que

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -\frac{27}{4}$$

4) Déterminer l'ensemble  $F_4$  des points M tels que

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} \leq -1$$

2) En raisonnant par disjonction de cas sur le signe de  $k - \frac{AB^2}{2}$ ,

caractériser l'ensemble des points M du plan tels que  $MA^2 + MB^2 = k$