

CALCULS DE DÉRIVÉES : RAPPELS ET COMPLÉMENTS

1) FONCTION DÉRIVABLE – NOMBRE DÉRIVÉ : RAPPELS

Soit f une fonction définie sur un intervalle ou sur une réunion d'intervalles deux à deux disjoints et $a \in D_f$.

Définition : Nombre dérivé

Dire que la fonction f est dérivable en a et que le nombre dérivé de f en a est le réel L , revient à dire que le taux de variation de f en a , $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, admet pour limite finie L quand h tend vers 0.


Le nombre dérivé est noté $f'(a)$, et on a :

Soit M le point de C_f d'abscisse $a+h$.

Le coefficient directeur de la droite (AM) est :

Géométriquement, la tangente à C_f au point A se conçoit comme la droite « position limite » des sécantes (AM) lorsque M tend vers A en restant sur la courbe.

Si f est dérivable en a , la « position limite » de ces sécantes a pour coefficient directeur $f'(a)$, et passe par A .



Propriété : Équation de la tangente

Si f est dérivable en a , la courbe C_f admet au point $A(a; f(a))$ une tangente T de coefficient directeur $f'(a)$.

Une équation de la tangente en ce point est :

Cas particuliers importants :

- Si $f'(a) = 0$, C_f admet au point d'abscisse a une tangente parallèle à l'axe des abscisses (horizontale) d'équation
- Si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = +\infty$ (ou $-\infty$), f n'est pas dérivable en a , mais C_f admet une tangente verticale d'équation

Définition : Fonction dérivée

On dit qu'une fonction f est **dérivable** sur un intervalle I ($I \subset D_f$) si pour tout x appartenant à I , le nombre dérivé de f en x existe.

La fonction dérivée de f sur I est la fonction, notée f' , qui, à tout x de I , associe le réel $f'(x)$.

Cette définition s'étend à une réunion d'intervalles disjoints.

Par abus de langage, on dit que f' est « la dérivée de f »

Propriété :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a est un réel de I .

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

2) DÉRIVÉE ET SENS DE VARIATION : RAPPELS

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si f est croissante sur I , alors pour tout x de I ,
- Si f est décroissante sur I , alors pour tout x de I ,
- Si f est constante sur I , alors pour tout x de I ,

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$, alors f est croissante sur I .
- Si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$, alors f est décroissante sur I .
- Si pour tout x de I , $f'(x) = 0$, alors f est constante sur I .

Remarques :

- Si la dérivée f' est strictement positive sur I , sauf peut-être en un nombre fini de réels où elle s'annule, alors f est strictement croissante sur I .
- Si la dérivée f' est strictement négative sur I , sauf peut-être en un nombre fini de réels où elle s'annule, alors f est strictement décroissante sur I .


Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et c un réel de I .

Si f admet un extremum local en c , alors

Conséquences graphiques:

On a $f'(c) = 0$, ainsi le coefficient directeur de la tangente à C_f en C est nul.



Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et c un réel de I .

Si la dérivée f' s'annule en c en changeant de signe, alors $f(c)$ est un extremum local de f sur I .

3) FORMULES DE DÉRIVÉES

DÉRIVÉES DE QUELQUES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

Fonction f	Fonction dérivée f'	Ensemble de dérivabilité
$f : x \mapsto k \ (k \in \mathbb{R})$		
$f : x \mapsto ax + b$		
$f : x \mapsto \sqrt{x}$		
$f : x \mapsto x^n \ n \neq 0, n \in \mathbb{N}$		
$f : x \mapsto e^x$		

OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DÉRIVABLES

Soit u et v deux fonctions dérivables sur I (I représente un intervalle ou une réunion d'intervalles disjoints) et k un réel, alors :

- Les fonctions $k \cdot u$, $u + v$ et $u \cdot v$ sont dérivables sur I et:
- Si pour tout réel a de I , $v(a) \neq 0$, les fonctions $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sont dérivables sur I et:

POLYNÔMES ET FONCTIONS RATIONNELLES

- Toute fonction polynôme est une somme de fonctions dérivables sur \mathbb{R} , donc est dérivable sur \mathbb{R} .
- Toute fonction rationnelle (quotient de deux polynômes) est dérivable sur son ensemble de définition.

DÉRIVÉE DE $f : x \mapsto g(ax + b)$

Soit a et b deux réels et g une fonction dérivable sur un intervalle I .

Pour tout réel x , tel que $ax + b \in I$, la fonction f définie par $f(x) = g(ax + b)$ est dérivable, et on a :

DÉRIVÉE DE \sqrt{u}

Soit u une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle I . Alors la fonction f définie sur I par $f(x) = \sqrt{u(x)}$ est dérivable sur I , et pour tout $x \in I$, on a :

DÉRIVÉE DE u^2

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors la fonction f définie sur I par $f(x) = [u(x)]^2$ est dérivable sur I , et pour tout $x \in I$, on a :

DÉRIVÉE DE e^u

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors la fonction f définie sur I par $f(x) = e^{u(x)}$ est dérivable sur I , et pour tout $x \in I$, on a :