

Thèmes d'étude :

Modèles définis par une fonction d'une variable

Modèles d'évolution

Calculs d'aires

Nombre dérivé d'une fonction en « un point »**Ex 3-1 : Vrai ou faux : restituer les notions du cours**

1) Pour savoir si une fonction est dérivable en un réel a , on regarde la limite de $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ lorsque h tend vers a .


2) Il est possible qu'une fonction ne soit pas dérivable en un réel a .

3) Si une fonction f est dérivable en a , la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a admet pour équation $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

4) Si une fonction f est dérivable en a , le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a est égal à la limite d'un taux de variations de f .

Ex 3-2 : QCM : restituer les notions du cours

Soit f la fonction définie sur $[0;4]$ représentée ci-dessous :



1) Au point d'abscisse 1 :

- a) f n'est pas dérivable
- b) f est dérivable et $f'(1)=0$
- c) f est dérivable et $f'(1)=2$

2) Au point d'abscisse 2,4 :

- a) f n'est pas dérivable
- b) f est dérivable et $f'(2,4)=-1$
- c) f est dérivable et $f'(2,4)=1$

3) Au point d'abscisse 0 :

- a) f n'est pas dérivable
- b) f est dérivable et $f'(0)\approx 2$
- c) f est dérivable et $f'(0)\approx 1$

Ex 3-3 : Calculer le nombre dérivé

Déterminer si le nombre dérivé de la fonction f en a existe et, si c'est le cas, calculer $f'(a)$.


1) $f : x \mapsto x\sqrt{x}$, $a=0$

2) $f : x \mapsto |x-3|$, $a=3$

3) $f : x \mapsto |x-5|$, $a=3$


Ex 3-4 : Déterminer $f'(a)$ à l'aide d'un graphique.

Dans chacun des cas ci-dessous, on considère la courbe représentative C_f d'une fonction f , et A un point de C_f d'abscisse a .
Déterminer $f'(a)$.



Ex 3-5 : Déterminer l'équation d'une tangente à l'aide d'un graphique

Soit f la fonction définie sur $[1;5]$ dont la courbe représentative est donnée ci-contre :
Déterminer si f est dérivable en a .



Si tel est le cas, déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a .

1) $a=1$

2) $a=2$


3) $a=3$

4) $a=4$

5) $a=5$

Ex 3-6 : Signe du nombre dérivé

La courbe représentative d'une fonction dérivable a été tracée ci-contre.



Déterminer graphiquement le signe (ou l'éventuelle nullité) des réels suivants :

- | | | |
|-------------|------------|----------------------------------|
| a) $f'(-3)$ | b) $f'(1)$ | c) $f'\left(\frac{4}{5}\right)$ |
| d) $f'(2)$ | e) $f'(5)$ | f) $f'\left(\frac{50}{7}\right)$ |

Calculs de dérivées

Ex 3-7 :

Dans chacun des cas, calculer la dérivée, en indiquant sur quel ensemble les calculs sont valables.

a) $f : x \mapsto (x-2) \times (x-4)$

b) $f : x \mapsto \frac{x}{x^2-1}$

c) $f : x \mapsto \frac{x-2}{\sqrt{x}}$

d) $f : x \mapsto (x^2-1)\sqrt{x}$

i) $f : x \mapsto \sqrt{3x-7}$

j) $f : x \mapsto \sqrt{x^2+5}$

e) $f : x \mapsto 3x^3-2x^2+2x+5$

f) $f : x \mapsto (3x-2)^2+e^x$

Ex 3-8 :

Dans chacun des cas, calculer la dérivée, en indiquant sur quel ensemble les calculs sont valables.

a) $f(x)=4x^3-2e^x$

d) $f(x)=\frac{1}{e}-\frac{1}{e^x}$

g) $f : x \mapsto (x-3)(x^4+1)$

h) $f : x \mapsto x\sqrt{x}+\frac{1}{x}$

b) $f(x)=-xe^x$

e) $f(x)=3e^{x^2-1}$

c) $f(x) = (4x-1)e^{\frac{1}{x}}$

f) $f(x) = \frac{2-3e^x}{1+e^x}$


Tangentes

Ex 3-9 : Déterminer a et b

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = (ax+b)e^x$ où a et b sont deux réels. On note C sa courbe représentative et T la tangente au point d'abscisse 0.

1) Lire graphiquement la valeur de $f(0)$.

2) En déduire la valeur de b .




3) Lire graphiquement la valeur de $f'(0)$.

4) Calculer $f'(x)$ et en déduire la valeur de a .

Ex 3-10 : Tangente parallèle à une droite donnée

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 - x^2 - x$

On note C_f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



1) Déterminer la fonction dérivée de f .

2) Dans chacun des cas ci-dessous, déterminer lorsqu'elles existent, toutes les tangentes à C_f parallèles à la droite proposée.

Lorsqu'elles existent, préciser l'équation de ces tangentes, puis tracer les sur le graphique ci-dessus.

a) $d_1: y=0$

b) $d_2: y=x$

c) $d_3: y=-3x$

d) $d_4: y = \frac{1}{9}x$

2) $f: x \mapsto \sqrt{4x^2 - 1}$, $I = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$

Dérivées, variations et extrema

Ex 3-11 : Vrai ou faux : restituer les notions du cours

1) Si une fonction f est décroissante sur \mathbb{R} , alors f est dérivable sur \mathbb{R} et sa dérivée est négative.

2) Si f est une fonction dont la dérivée est nulle, alors f est constante.

3) Si f est une fonction dérivable en a telle que $f'(a) = 0$, alors f admet un maximum local en a .

4) Une fonction f admet un maximum local en 3 sur $[1; 4]$ s'il existe un intervalle ouvert $]a; b[$ inclus dans $[1; 4]$ et contenant 3 tel que pour tout x appartenant à $]a; b[$, on a $f(x) \leq f(3)$.

5) Si une fonction f admet un maximum local en a , alors f est dérivable en a .

Ex 3-12 : Déterminer les variations d'une fonction

Dans chacun des cas ci-dessous, étudier les variations (sans les limites) de f sur I , puis déterminer les éventuels extrema de f .

1) $f: x \mapsto e^{x^5} + 1$, $I = \mathbb{R}$

3) $f: x \mapsto x + \frac{3}{x}$, $I = [1; 4]$

4) $f : x \mapsto \frac{x-1}{2-x}$, $I = \mathbb{R} - \{2\}$

6) $f : x \mapsto e^{\frac{x^3-9}{2}x^2+6x+4}$, $I = \mathbb{R}$

5) $f : x \mapsto \frac{x^2+3x}{x+1}$, $I =]0;1[$

7) $f : x \mapsto x\sqrt{x-x}$, $I = \left[\frac{1}{4};6\right]$

Ex 3-13 : Montrer des inégalités

Démontrer, à l'aide d'une étude de fonction, chacune des inégalités proposées sur l'intervalle I.

1) $\frac{1}{1-x} \leq x-3$, $I=[2;+\infty[$

Aide : étudier la fonction $d : x \mapsto \frac{1}{1-x} - (x-3)$

2) $x^2 \geq x\sqrt{x} - \frac{1}{2}$, $I=]0;4]$

Ex 3-14 : Trouver une fonction vérifiant des conditions

Dans chacun des cas suivants, donner un exemple d'une fonction (ou d'une représentation graphique de fonction) vérifiant la ou les conditions(s) proposée(s) :

1) f est dérivable sur \mathbb{R} , et sa fonction dérivée est négative sur \mathbb{R} .

2) f est définie sur \mathbb{R} , dérivable sur \mathbb{R}^* , décroissante sur \mathbb{R}^- et croissante sur \mathbb{R}^+ .

3) f est définie et dérivable sur \mathbb{R}^* , et sa dérivée est positive sur \mathbb{R}^* .

4) f est définie sur \mathbb{R}^+ , dérivable uniquement sur \mathbb{R}_+^* , et sa fonction dérivée est positive sur \mathbb{R}_+^* .

5) f est dérivable sur \mathbb{R} et admet un maximum local en 4.

6) f est dérivable sur \mathbb{R}^+ , sa fonction dérivée est positive sur \mathbb{R}^+ et s'annule en 0.

Ex 3-15 : Position relative d'une courbe et d'une tangente en un point

Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = x^3 - 2x$

1) Calculer $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f .

2) Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C_f représentative de f au point A d'abscisse 1.

3) Soit g la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = x - 2$.

a) Montrer que $f(x) - g(x) = (x-1)(x^2 + x - 2)$

b) Étudier le signe de $h(x) = f(x) - g(x)$.

c) En déduire la position relative de C_f par rapport à T .

Ex 3-16 : Position relative de deux courbes

soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2 + 3x + 1$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{-2\}$ par $g(x) = -\frac{1}{x+2}$.

On note C_f et C_g les courbes représentatives respectives des fonctions f et g .

1) Étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations.

2) Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variations.

3) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{-2\}$ par $h(x) = f(x) - g(x)$.

a) Développer $(x+1)^2(x+3)$

b) Étudier le signe de $h(x)$.

c) Déterminer la position relative de C_f par rapport à C_g .

4) Démontrer que C_f et C_g admettent une tangente commune en un de leurs points d'intersection. Donner une équation de cette tangente.


Ex 3-17 : Équations

1) Justifier que l'équation $x^5 - 2x^3 + 3x - 20 = 0$ possède une unique solution α sur \mathbb{R} .

2) Avec la calculatrice, donner un encadrement de α .

Problèmes et algorithmes

Ex 3-18 : Distance maximale



ABCD est un carré de côté 1. M est sur le segment [AB]. On place le point N tel que $CN = AM$ sur la demi droite [BC) à l'extérieur du segment [BC].

La droite (MN) coupe (DC) en P. On pose $AM = x$ avec $0 \leq x \leq 1$.

Le but de l'exercice est de trouver M sur [AB] tel que la distance PC soit maximale.

1) Démontrer que $PC = \frac{x - x^2}{1 + x}$

2) a) Étudier les variations de la fonction f définie sur $[0;1]$ par


$$f(x) = \frac{x-x^2}{1+x}$$

b) En déduire la valeur de x pour laquelle la distance PC est maximale.

Ex 3-19 : Parabole et aire maximale

La parabole d'équation $y = -\frac{2}{9}x^2 + 8$ coupe l'axe des abscisses en A et B.

Le point $P(x; y)$ se déplace sur la parabole entre A et B.



Le but du problème est de déterminer les coordonnées du point P pour que l'aire du triangle rectangle AHP soit maximale.

1) Déterminer les coordonnées des points A et B.

2) On note $f(x)$, l'aire du triangle en fonction de x .

a) Déterminer l'ensemble de définition de f .

b) Montrer que $f(x) = -\frac{1}{9}x^3 - \frac{2}{3}x^2 + 4x + 24$

3) Étudier les variations de f .

4) Répondre au problème posé.

Ex 3-20 : Taux d'alcoolémie

Un étude sur un jeune homme de 64kg ayant ingéré une dose de 33g d'alcool a permis d'établir que le taux d'alcool dans le sang, en fonction du temps t en heure, est donné par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$f(t) = (2t - 0,05)e^{-t}$$

La représentation graphique de cette fonction dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous :



1) Avec la précision permise par le graphique, déterminer combien de temps après l'ingestion le taux d'alcool passe au-dessous du seuil de $0,25 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$

2) Un taux d'alcool dans le sang inférieur à $0,001 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ est considéré comme négligeable.

En complétant, puis en utilisant le programme écrit en python ci-dessous, déterminer à partir de combien de temps (à 10^{-2} près) le taux d'alcool dans le sang du jeune homme est négligeable ?

```

1 from math import exp
2 x=.....
3 while (2*x-0.05)*exp(-x)>.....:
4     x=.....
5 print(x)
    
```

3) Déterminer le tableau de variation de f .

4) En déduire une valeur approchée au centième du taux maximum d'alcool dans le sang du jeune homme.

Ex 3-21 : Décroissance radioactive

On étudie une population de noyaux radioactifs de carbone 14 au cours du temps.

À l'instant $t=0$, la population est composée de N_0 noyaux radioactifs de carbone 14.

On modélise le nombre de noyaux radioactifs de carbone 14 à l'instant t , exprimé en milliers d'années, par la fonction N définie sur $[0; +\infty[$ par : $N(t) = N_0 e^{-0,121t}$



1) Étudier les variations de la fonction N sur $[0; +\infty[$.

2) a) On appelle demi-vie du carbone 14 le temps T au bout duquel la population de noyaux radioactifs a diminué de moitié.

Justifier que $e^{-0,0121T} = \frac{1}{2}$

b) Déterminer avec un programme écrit en python une valeur approchée au millième de la demi-vie T du carbone 14.



3) a) Démontrer que $N(2T) = \frac{N_0}{4}$

b) En déduire au bout de combien de temps le nombre de noyaux radioactifs de carbone 14 n'est plus égal qu'au quart de sa valeur initiale.